

# Saimiri cassiquiarensis

LC

VU

EN

CR

DISTRIBUCIÓN



CONOCER  
PARA CONSERVAR

MONO TITÍ O MONO ARDILLA  
HUMBOLDT'S SQUIRREL MONKEY

La mayoría de investigaciones en la especie se realizan sobre biogeografía, relaciones filogenéticas, ecología, comportamiento, datos demográficos y causas de disminución poblacional.



Poseen baja territorialidad.



Después de 2-5 semanas, los bebés no son cargados por la madre sino por otros miembros del grupo.



Pueden actuar como dispersores de semillas y controladores biológicos.



Las hembras prefieren a los machos que tengan mayor peso antes del periodo de apareamiento.

# Saimiri cassiquiarensis

MONO TITÍ O MONO ARDILLA  
HUMBOLDT'S SQUIRREL MONKEY

Poseen color verde oliva a tostado en la corona. De la misma manera tiene distribución extensa de pelos anaranjados en los antebrazos.



## AMENAZAS

TRÁFICO ILEGAL

DEFORESTACIÓN

## PROYECTO ZOCAY

DIRIGIDO POR XYOMARA CARRETERO PINZÓN. BIÓLOGA, PhD

Monitorear las densidades de primates en bosques colombianos y las relaciones intra e interespecíficas de algunas especies de monos colombianos.

Analizar la respuesta ecológica y comportamental de los monos ante la reducción de recursos.



[proyectozocaysanmartinmeta.blogspot.com/](http://proyectozocaysanmartinmeta.blogspot.com/)




Sus investigaciones se basan en estudiar los factores que provocan la reducción poblacional de primates y realizar proyectos de conservación con otros grupos.



Ofrecen apoyo y dirección a estudiantes que deseen realizar sus trabajos de grado o prácticas en relación a la investigación en primates

## DATOS CURIOSOS



Es la única especie de mono ardilla existente en Colombia.



A diferencia de otros monos del nuevo mundo, su cola no se usa para escalar



Voluntari@: Angie Cadena

Diseñado por Diana Marcela Linero Triana

